

Zone de hrănire pe timpul iernii pentru găște sălbatice

Definiție: zonele de hrănire de pe timpul iernii pentru găște sunt acele pășuni, câmpuri cultivate cu cereale de toamna sau rapiță care sunt folosite în mod regulat de gaștele sălbatice pe durata perioadei cuprinse între octombrie și sfârșitul lunii martie. Numai găștele sălbatice (gârlițele mari, găștele de vară și găștele cu gât roșu) pot fi luate în considerare.

Scop: protecția și creșterea calității zonelor de hrănire ale găștelor sălbatice prin practici agricole adecvate.

Obiective de biodiversitate: acest plan va contribui la implementarea Planului National de Acțiune pentru gășca cu gât roșu.

CERINȚE DE MANAGEMENT

Pășuni

- pășunatul este interzis din 1 octombrie până în 31 martie – nu există restricții de pășunat din 1 aprilie până în 30 septembrie;
- este interzisă folosirea pesticidelor în perioada 1 octombrie - 31 martie;
- îngrășămintele naturale nu pot fi folosite între 15 septembrie și 31 martie.

Câmpurile cu cereale și rapiță

- cultivarea și însămânțarea cerealelor de toamnă și a rapiței trebuie finalizată înainte de 1 octombrie pentru a asigura cel puțin două luni de creștere a culturilor înaintea sosirii în noiembrie a păsărilor migratoare sau a celor care ierneză. (Datele recomandate pentru însămânțările din toamnă nu vor depăși luna septembrie);
- culturile de porumb să fie recoltate numai mecanic și nu manual începând din septembrie (octombrie);
- miriștea să fie arată doar în primăvară – pentru culturile de porumb;
- pesticidele și fitostimulatorii nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânțarea de toamnă și 31 martie.

Toate zonele

- se interzic lucrările agricole între 1 octombrie și 31 martie;
- este interzisă folosirea metodelor de alungare, otrăvirilor și a semințelor tratate chimic între 1 octombrie și 31 martie.
- vânatoarea în perioada de hrănire este interzisă.